

Zertifizierte Fortbildung



BAYERISCHE
LANDESÄRZTEKAMMER

Zertifizierte medizinische
Fortbildung in Zusammenarbeit
mit der bayerischen Landes-
ärztekammer

Hier können Ärzte Punkte sammeln für

- das Pflicht-Fortbildungszertifikat für Vertragsärzte
- freiwillige Fortbildungszertifikate, die von vielen Landesärztekammern angeboten werden.

Bitte beantworten Sie die Fragen und faxen Sie den Bogen an die Redaktion HIV&more. Sie erhalten umgehend Ihr Zertifikat.

- Was ist **richtig**? Erreger der Syphilis ist ...*
 - Spirochaeta motens
 - Spirochaeta syphilis
 - Treponema turbulens
 - Treponema luetica
 - Treponema pallidum
- Was ist **richtig**? Die Syphilis ...*
 - ... ist bei Neugeborenen keine Seltenheit
 - ... ist die häufigste Geschlechtskrankheit in Deutschland
 - ... ist insbesondere häufig bei Männern, die Sex mit Männern haben
 - ... ist bei HIV-Infizierten selten
 - ... nimmt bei Frauen deutlich zu
- Was ist **falsch**? Bei HIV-Infizierten mit Syphilis ...*
 - ... kann die HI-Viruslast ansteigen
 - ... kann es bei zuvor komplett supprimierten Viruslast zur Virämie kommen
 - ... kann die CD4-Zahl abfallen
 - ... sind Effekte auf HIV-Replikation und Immunstatus reversibel
 - ... verläuft die Syphilis milder
- Was ist **falsch**? Zu den Zeichen der Syphilis können gehören ...*
 - Ulcus durum
 - Lymphknotenschwellung
 - Exanthem
 - Kopfschmerzen
 - eitriger Ausfluss
- Was ist **richtig**? Die Syphilis ...*
 - ... manifestiert sich in der Regel innerhalb von wenigen Tagen
 - ... ist in jedem Stadium ansteckend
 - ... äußert sich im Primärstadium als eitriger Abszeß
 - ... befällt nur selten das ZNS
 - ... kann bei Neurolues Kopfschmerzen verursachen
- Was ist **richtig**? Was versteht man unter „Stufendiagnostik der Syphilis“? ...*
 - ... Blut- und Liquoruntersuchung
 - ... klinisches Bild und Schnelltest
 - ... Dunkelfeldmikroskopie und Bestätigungstest
 - ... Suchtest und Bestätigungstest
 - ... Suchtest, Bestätigungstest und Test zur Beurteilung der Aktivität
- Was ist **richtig**? Eine Therapie ist immer indiziert ...*
 - ... bei positiver Syphilis-Serologie.
 - ... wenn Such- und Bestätigungstest positiv sind.
 - ... bei reaktivem 19-S-IgM-FTA-Abs-Test ohne Vorbehandlung.
 - ... wenn der Patient Kopfschmerzen hat.
 - ... wenn der Patient vor kurzem Kontakt mit einem Syphilis-Infizierten hatte.
- Was ist **falsch**? Zu den Mittel der Wahl bei Lues gehören ...*
 - Penicillin
 - Doxycyclin
 - Ceftriaxon
 - Ciprofloxacin
 - Erythromycin
- Was ist **falsch**? Die Neurolues behandelt man ...*
 - ... immer über 21 Tage
 - ... ohne Cortison vor Therapiebeginn
 - ... am besten mit Penicillin 30 Mio. IE IV
 - ... bei Penicillinallergie mit Ceftriaxon 2 g IV
 - ... bei Allergie gegen Penicillin und Cephalosporine mit Doxycyclin 200 mg oral
- Was ist **falsch**? Nach Therapie einer Syphilis ...*
 - ... bleiben treponemspezifische Antikörper meist lebenslang nachweisbar.
 - ... sollte der IgM-Test nach 3 Monaten negativ sein.
 - ... sollte der VDRL in 3 Monaten um 2 Titerstufen abfallen.
 - ... sind regelmäßige serologische Kontrollen bis Monat 24 indiziert.
 - ... zeigt ein Wiederanstieg des VDRL eine Neuinfektion bzw. Reaktivierung an.

Name, Anschrift, Tel.-Nr., E-Mail

Datum/Unterschrift