

PrEP: Cabotegravir besser als TDF/FTC

Die weltweite Studie HPTN 083 wurde nach einer geplanten Zwischenauswertung abgebrochen, weil Cabotegravir i.m. alle zwei Monate der täglichen Einnahme von TDF/FTC überlegen war. An der Studie nahmen 4.600 MSM und transgener Frauen teil. Unter TDF/FTC kam es zu 38 neuen HIV-Infektionen im Vergleich zu 12 Infektionen in der Cabotegravir-Gruppe (Inzidenz 0,38% vs 1,21%). Die Studienleitung empfahl, allen Teilnehmer die Injektionsprophylaxe anzubieten.

Pressemitteilung ViiV Healthcare

Akute Hepatitis C: AASLD empfiehlt sofort behandeln

Die neuen Leitlinien der amerikanischen Hepatologen empfehlen bei der akuten Hepatitis C neuerdings eine „Treat and Treat“-Strategie, d.h. die Behandlung sollte gleich nach Diagnosestellung (Nachweis von HCV-RNA) eingeleitet werden ohne eine eventuelle Spontanheilung bzw. Chronifizierung abzuwarten. Zur Therapie sollten die gleichen Regime wie zur Behandlung der chronischen Hepatitis C eingesetzt werden.

<https://www.hcvguidelines.org/unique-populations/acute-infection>

COVID-19 Kongresse

Die Internationale AIDS-Gesellschaft (IAS) wird den ersten (virtuellen) COVID-Kongress abhalten. Die Konferenz wird am 10.-11. Juli 2020 im Anschluss an den virtuellen WeltAidsKongress stattfinden. Die Registrierung ist kostenlos.

<https://covid19.aids2020.org/>



Etwas später, vom 23.-25. September 2020 wird die ebenfalls virtuelle Conference on Corona Virus Disease (ECCVID) – organisiert vom ESCMID (European Society Clinical Microbiology and Infectious Diseases) – stattfinden.

https://www.escmid.org/news_media/news/



Twittern mit den Infektiologen



<https://twitter.com/InfektioDE> · https://twitter.com/LEOSS_CoV_2
https://twitter.com/DZIF_ · <https://twitter.com/JungelInfektio>

www.hivandmore.de

LAMIDOL: Umstellung auf DTG+3TC



Die Dauer der Virussuppression vor Studienbeginn hatte weder auf die residuelle Virämie noch auf die HIV-DNA-Konzentration Einfluss. Für die Größe des zellulären Reservoirs spielte der CD4-Nadir keine Rolle.

<https://www.hivandmore.de/infocenter/viiv/>

Doravirin: Kombination mit vielen häufig angewendeten Medikamenten möglich



Erzählen Ihnen Ihre HIV-Patienten immer, welche Medikamente sie neben der HIV-Therapie einnehmen?

<https://www.hivandmore.de/infocenter/msd/>