

ART bei Schluckstörung

Die antiretrovirale Therapie von Erwachsenen mit Schluckstörung ist selbst für erfahrene HIV-Behandler*innen eine Herausforderung. Bereits in HIV&more 2/2016 wurden zu diesem Thema über die Fachinformation hinausgehende Informationen veröffentlicht. Mittlerweile sind einige neue Regime zugelassen worden.

Die folgende Tabelle informiert über die Möglichkeiten des Einsatzes der neuen Medikamente bei Schluckstörung. Die Tabellen wurden in Zusammenarbeit mit den Herstellern sorgfältig erarbeitet. Vielen Dank an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung. Für eine Anwendung außerhalb der Zulassung können jedoch

weder Verlag, Herausgeber noch Hersteller die Verantwortung übernehmen.

Alle Informationen zu ART bei Schluckstörung sind hier abrufbar

<https://www.hivandmore.de/medikamente/art-bei-schluckstoerung.shtml>

	Darreichungsform	Erhältliche Dosierungen	Fachinfo (mit oder ohne Essen?)	Fachinfo (zerkleinert?)	Klinische Erfahrung/ Besonderheiten
Biktarvy®	Filmtablette	50 mg Bictegravir / 200 mg Emtricitabin / 25 mg Tenofovir-alafenamid	Unabhängig von einer Mahlzeit	Die Filmtabletten dürfen nicht zerkaut, zerkleinert oder geteilt werden.	Keine Studiendaten zur Zerkleinerung und / oder Sondengabe, nur Fallberichte. Off-Label.
Delstrigo®	Filmtablette	100 mg Doravirin 300 mg Lamivudin 245 Tenofovidiproxil	Unabhängig von einer Mahlzeit	Als Ganzes schlucken	Keine Daten zur Zerkleinerung
Dovato®	Filmtablette	DTG 50 mg / 3TC 300 mg	Mit oder ohne Mahlzeit	Zum Einnehmen	Kann geteilt / zerkleinert und unverzüglich mit geringer Menge halbflüssiger oder flüssiger Nahrung eingenommen werden. ** Medical Information ViiV
Odefsey®	Filmtablette	200 mg Emtricitabin / 25 mg Rilpivirin / 25 mg Tenofovir-alafenamid	Zum Essen	Es wird empfohlen, die Filmtablette aufgrund des bitteren Geschmacks nicht zu zerkauen, zu zerkleinern oder zu teilen.	Keine Daten zu Zerkleinerung/ Suspendierung der Tablette oder zu Sondengabe. Off-Label.
Pifeltro®	Filmtablette	100 mg Doravirin	Unabhängig von einer Mahlzeit	Als Ganzes schlucken	Keine Daten zur Zerkleinerung
Rukobia®	Retardtablette	Fostemsavir 600 mg	Mit oder ohne Mahlzeit	Zum Einnehmen	Aufgrund der Retardformulierung sollten Rukobia Tabletten im Ganzen geschluckt werden.
Tivicay®	Filmtablette	Dolutegravir 10 mg / 25 mg / 50 mg	Mit oder ohne Mahlzeit	Zum Einnehmen	Kann geteilt / zerkleinert und unverzüglich mit geringer Menge halbflüssiger oder flüssiger Nahrung eingenommen werden. ** Medical Information ViiV
Vocabria® Oral	Filmtablette	Cabotegravir 30 mg	Mit oder ohne Mahlzeit	Zum Einnehmen	Nur in Kombination mit Edu-rant zur oralen Einleitung der langwirksamen Injektionstherapie Vocabria + Rekambys zugelassen. Kann geteilt/ zerkleinert und unverzüglich mit geringer Menge halbflüssiger oder flüssiger Nahrung eingenommen werden. ** Medical Information ViiV