

# CME-Modul: Erektile Dysfunktion und Präexpositionsprophylaxe



BAYERISCHE  
LANDESÄRZTEKAMMER  
Zertifizierte medizinische  
Fortbildung in Zusammenarbeit  
mit der bayerischen Landes-  
ärztekammer

Die Bayerische Landesärztekammer hat dieses CME-Modul mit 1 Punkt zertifiziert. Bitte kreuzen Sie eine der vier Antwortmöglichkeiten an und **mailen** Sie den ausgefüllten Fragebogen an **info@hivandmore.de** oder faxen Sie ihn an **HIV&more 089 - 649 197 55**. Sie erhalten dann umgehend Ihr Zertifikat.

## 1. Zu den Risikofaktoren für eine erektile Dysfunktion gehört NICHT:

- Diabetes mellitus
- Hypertonie
- Rauchen
- HIV-PrEP (Präexpositionsprophylaxe)

## 2. Welche therapeutische Möglichkeiten gibt es bei erektiler Dysfunktion? RICHTIG ist

- PDE 5-Hemmer
- MUSE (urethale Medikation)
- Schwellkörper-Autoinjektion
- Alle diese Optionen

## 3. PDE 5-Hemmer unterscheiden sich NICHT voneinander im Hinblick auf

- Wirkeintritt
- Wirkdauer
- Wirkmechanismus
- Preis

## 4. PDE 5-Hemmer sind KONTRAINDIZIERT bei

- Vorhofflimmern
- Nicht-arterielle anteriore ischämische Optikusneuropathie (NAION)
- Glaukom
- Diabetes mellitus

## 5. Zu den Nebenwirkungen von PDE 5-Hemmern gehört NICHT

- Kopfschmerz
- Hypertensive Krise
- Rhinitis
- Priapismus

## 6. Indikation für eine PrEP - laut den Deutsch-Österreichischen Leitlinien- BESTEHT bei

- substantiellem Risiko für eine HIV-Infektion
- Schwangerschaft bei einer HIV-positiven Frau
- medizinischem Personal mit Kontakt zu HIV-positiven Personen
- medizinischem Personal bei invasiven Eingriffen bei HIV-positiven Personen

## 7. Welches Medikament ist in Deutschland zur PrEP zugelassen? RICHTIG ist

- Cabotegravir
- TDF/FTC
- TAF/FTC
- ABC/3TC

## 8. Welche PrEP ist für schwangere und stillende Frauen geeignet? RICHTIG ist

- TAF/FTC
- TDF/FTC
- ABC/3TC
- Keine

## 9. Welche Aussage zur Anwendung der PrEP mit TDF/FTC ist RICHTIG?

- Start 1 Tablette unmittelbar vor dem Sex, je 1 Tablette folgende 2 Tage
- Start 2 Tabletten unmittelbar vor dem Sex, je 1 Tablette folgende 2 Tage
- Start 1 Tablette mindestens 2 Stunden vor dem Sex, je 1 Tablette folgende 2 Tage
- Start 2 Tabletten mindestens 2 Stunden vor dem Sex, je 1 Tablette folgende 2 Tage

## 10. Welche Aussage zur PrEP mit TAF/FTC im Vergleich zur TDF/TAF ist RICHTIG?

- TAF/FTC führt zu einer geringeren Gewichtszunahme
- TAF/FTC wirkt kardioprotektiv
- TAF/FTC hat einen geringeren Einfluss auf die Nierenfunktion
- TAF/FTC ist billiger