

CME-Modul: Dengue-Fieber

**BAYERISCHE
LANDESÄRZTEKAMMER**Zertifizierte medizinische
Fortbildung in Zusammenarbeit
mit der bayerischen Landes-
ärztekammer

Die Bayerische Landesärztekammer hat dieses CME-Modul mit 1 Punkt zertifiziert. Bitte kreuzen Sie eine der vier Antwortmöglichkeiten an und **mailen** Sie den ausgefüllten Fragebogen an **info@hivandmore.de**. Sie erhalten dann umgehend Ihr Zertifikat.

1. Am häufigsten ist Dengue-Fieber in

- Subsahara Afrika
- Naher Osten
- Asien
- Australien

2. Eine besonders hohe Sterblichkeit findet sich bei ...

- über 60jährigen
- Adoleszenten
- kleinen Kindern
- Schwangeren

3. Dengue-Fieber ...

- hinterlässt generell eine lebenslange Immunität
- hinterlässt eine lebenslange Immunität nur gegen den gleichen Serotypus
- kann bei Zweitinfektion einen schwereren Verlauf nehmen
- kann chronisch rezidivieren

4. Die Inkubationszeit des Dengue-Fiebers beträgt

- 24 bis 48 Stunden
- 3 bis 14 Tage
- 2 bis 3 Wochen
- länger als 3 Wochen

5. Welche Aussage zum klinischen Verlauf ist RICHTIG?

- Die meisten Patienten entwickeln hohes Fieber
- Typisch sind Kopf- und Gliederschmerzen
- Bläschen in verschiedenen Stadien sind pathognomisch
- Gastrointestinale Symptome sind starke Diarrhoen

6. Zu den Komplikationen des Dengue-Fiebers gehört NICHT

- Blutungskomplikationen
- ZNS-Befall mit Krampfanfällen
- Kreislaufchock
- Hepatitis

7. Für die Diagnose Dengue-Fieber ...

- ist die klinische Symptomatik ausreichend
- muss vorher eine Malaria ausgeschlossen sein
- sind Leuko- und Thrombopenie sowie erhöhtes LDL beweisend
- ist der direkte Virusnachweis obligat

8. Was ist FALSCH?

Bei der Behandlung von Dengue-Fieber ...

- steht die Behandlung der Symptome im Vordergrund
- sollte man ASS zur Analgesie und Antipyrese geben
- ist auf eine ausreichende Hydrierung zu achten
- ist ein stationärer Aufenthalt nur bei schwerem Verlauf indiziert

9. Was ist FALSCH?

Die Impfung Qdenga® gegen Dengue-Fieber ...

- ist eine Lebendvakzine
- darf auch bei schlechtem Immunstatus angewandt werden
- muss subkutan appliziert werden
- wird in zwei Dosen im Abstand von drei Monaten gegeben

10. Die Impfung Qdenga® wird von der DTG aktuell ...

- für jeden Asien-Reisenden empfohlen
- für Reisende in Hochprävalenzländer empfohlen
- für Immunsupprimierte empfohlen
- für Personen mit Langzeitaufenthalt im Endemiegebiet empfohlen