

CME-Modul: HIV und Tumore



**BAYERISCHE
LANDESÄRZTEKAMMER**
Zertifizierte medizinische
Fortbildung in Zusammenarbeit
mit der bayerischen Landes-
ärztekammer

Die Bayerische Landesärztekammer hat dieses CME-Modul mit 1 Punkt zertifiziert. Bitte kreuzen Sie eine der vier Antwortmöglichkeiten an und **mailen** Sie den ausgefüllten Fragebogen an **info@hivandmore.de**. Sie erhalten dann umgehend Ihr Zertifikat.

1. Zu den mit Humanen Papilloma-Viren assoziierten Tumoren gehört NICHT das

- Analkarzinom
- Zervixkarzinom
- Larynxkarzinom
- Hepatozelluläres Karzinom

2. Welches Lymphom tritt bei Menschen mit HIV NICHT häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung?

- Castlemann-Lymphom
- Non-Hodgkin-Lymphom
- Burkitt-Lymphom
- Multiples Myelom

3. Das Risiko an Krebs zu erkranken, ist bei Menschen mit HIV ...

- nur bei schlechtem Immunstatus erhöht
- generell erhöht
- nur für bestimmte Krebsarten erhöht
- schon seit 10 Jahren nicht mehr erhöht

4. Zu den Aids-definierenden Karzinomen gehört das

- Kaposi-Sarkom
- Analkarzinom
- Lungenkarzinom
- Malignes Melanom

5. Bei der Anti-Tumorthherapie sollte bei Menschen mit HIV die antiretrovirale Therapie ...

- wegen Interaktionen pausiert werden
- erst nach Beginn der Anti-Tumorthherapie eingeleitet werden
- bei unbehandelten Menschen mit HIV sofort eingeleitet werden
- bei Nebenwirkungen der Anti-Tumorthherapie nur in niedriger Dosierung weitergeführt werden

6. Unter einer Anti-Tumorthherapie kommt es in der Regel zu ...

- einem Anstieg der Viruslast
- zu einem Abfall der Helferzellen
- zu einem Immunrekonstitutionssyndrom
- keiner Veränderung von Immunstatus und Viruslast

7. Bei Anti-Tumor-Therapie ist eine Pneumocystis jirovecii Pneumonie (PjP)-Prophylaxe mit Cotrim forte indiziert ...

- In jedem Fall
- Nur bei PjP in der Anamnese
- Bei CD4-Zellen <200/ μ l
- Bei CD4-Zellen <350/ μ l

8. Eine antimykotische Prophylaxe sollte man erwägen, wenn ...

- der Patient früher eine Soorösophagitis hatte
- die CD4-Zahl unter 100/ μ l liegt
- der Patient bettlägrig ist
- Candida albicans im Rachenabstrich nachgewiesen wurde

9. Bei Anti-Tumorthherapie ist eine Behandlung der Hepatitis B indiziert, wenn ...

- HBV-DNA nachweisbar ist
- HBs-Ag nachweisbar ist
- Anti-HBc only nachweisbar ist
- in jeder der genannten Situationen

10. Bei Menschen mit HIV ist zusätzlich zum allgemeinen Krebscreening wegen des erhöhten Risikos folgende Untersuchung indiziert

- Röntgen Thorax wegen Bronchialkarzinom
- Abdomensonographie wegen HCC
- Analytologie wegen Analkarzinom
- PSA-Bestimmung wegen Prostatakarzinom